APPROUVÉ
Ordre du Ministère de la protection
de la santé de l'Ukraine
_____ № _____
Certificat d'enregistrement
№ _____

FICHE POSOLOGIQUE d'un médicament

TIVORTIN® ASPARTATE
(TIVORTIN ASPARTATUM)

Composition :
Principe actif: 5 ml de la solution contiennent 1 g de L-aspartate d'arginine (0,57 g de L-agrinine, 0,43 g d'acide aspartique);
Excipients: sorbitol (E 420), saccharine de soduim (E 954), méthyl-para-hydroxybenzoate (E 218), propyl-para-hydroxybenzoate (E 216), arôme alimentaire le «Caramel», eau purifiée.

Forme pharmaceutique. Solution pour l'utilisation par voie perorale.

Groupe pharmacothérapeutique. Autres préparations cardiologiques. Acides aminés. Le code ATC C01E.

Données cliniques.
Indications.
À la thérapie complexe de la maladie ischémique du coeur, de l'athérosclérose des vaisseaux du coeur et du cerveau, de l'hypertension artérielle, de l'athérosclérose des vaisseaux périphériques, de l'angiopathie diabétique, des état après l'infarctus aigu du myocarde et les troubles sévères de la circulation sanguine cérébrale, de la myocardiopathie, de l'insuffisance cardiaque chronique, de l'hypercholestérinémie, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, de la pneumonie interstitielle, de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, de l'hypertension pulmonaire post-embolique chronique, des hépatites aiguës et chroniques des différentes étiologies, de l'insuffisance hépatique, de l'encéphalopathie hépatique provoquée par l'hyperammoniémie, les états hypoxiques et asthéniques, de l'immunocorrection à l'affaiblissement de la fonction du thymus.

Contre-indications.
L'hypersensibilité, les alterations de la fonction rénale sévères, l'âge d'enfant (jusqu'à 18 ans).

Posologie et mode d'emploi.
Le médicament doit être administé par voie orale au cours des repas. La dose chez l'adulte en cas de maladie ischémique du coeur, d'athérosclérose des vaisseaux du coeur et du cerveau, d'athérosclérose des vaisseaux périphériques, d'angiopathie diabétique fait 5 ml (1 mesurette – 1 g de produit) 3-8 fois par 24 h. En cas d'hypercholestérinémie, d'états après l'infarctus aigu du myocarde et les troubles sévères de la circulation sanguine cérébrale, d'hypertension artérielle la dose fait 5 ml 3-6 fois par 24 h. En cas de maladies pulmonaires obstructives chroniques, de pneumonie interstitielle, d'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, d'hypertension pulmonaire post-embolique chronique la dose fait 5 ml 3-6 fois par 24 h.
En cas d'hépatites aiguës et chroniques des différentes étiologies, d'insuffisance hépatique, d'encéphalopathie hépatique provoquée par l'hyperammoniémie la dose fait 5 ml 3-6 fois par 24 h. En cas d'états hypoxiques et asthéniques, d'immunocorrection à l'affaiblissement de la fonction du thymus la dose fait 5 ml 4-8 fois par 24 h. La dose journalière maximale fait 8 g. La durée d'une cure est 8-15 jours; en cas de nécessité la cure peut être répétée.

Effets indésirables.

Il y a rarement la sensation de l'inconfort léger dans l'estomac et l'intestin, la nausée juste après l'utilisation du médicament, qui disparaissent indépendamment. Les réactions allergiques sont possibles.

Surdosage.
Symptômes: les réactions de l'hypersensibilité, les états hypoglycémiques.
Traitement : En can d'effets indiqués il est nécessaire d'arrêter l'utilisation du médicament. Le lavage de l'estomac, la prise des sorbents sont prescrits. Il n'y a pas d'antitidote. La thérapie est symptomatique.

Grossesse et allaitement.
Le produit passe à travers le placenta, c'est pourquoi pendant la grossesse il ne doit être administré que si le profit attendu pour la mère excède le risque potentiel pour le fétus. Les données en ce qui concerne l'usage du produit pendant l'allaitement sont absentes

Enfants.
Il n'y a pas de données en ce qui concerne l'administration du produit chez les enfants au-dessus de 18 ans.

Précautions particulières.
Il faut utiliser le produit avec précautions en cas de troubles électrolytiques, de maladies rénales.
À l'utilisation de la préparation il est nécessaire de se tenir au régime équilibré du sommeil et du repos, s'abstenir de la consommation d'alcool, de la nicotine et des psychotoniques. Si au fond de l'utilisation du produit les symptômes de l'asthénie s'accroissent, le traitement doit être supprimé.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Il n'y a pas d'effets .

Interaction avec d'autres médicaments et d'autres interactions.
À l'utilisation de L-aspartate d'arginine il est nécessaire de prendre en considération que l'administration simultanée de l'aminophylline avec l'arginine peut entraîner l'augmentation de l'insulinémie; l'administration simultanée du spironolactone avec l'arginine peut entraîner l'augmentation du taux de potassium dans le sang.

Propriétés pharmacologiques.
Pharmacodynamie. Le Tivortin® aspartate exerce l'effet antihypoxique, citoprotectif, antioxydant, l'effet de désintoxication, stabilisateur de membrane. Il joue le rôle important dans les procès de la neutralisation de l'ammoniaque et stimulation de son élimination de l'organisme, intensifie la fonction de désintoxication du foie. Il produit l'effet hépatoprotecteur, influence positivement les procès de l'approvisionnement en énergie aux hépatocites.
Comme le donateur de l'oxyde d'azote, Tivortin® aspartate participe aux procès de l'approvisionnement en énergie de l'organisme, diminue l'activation et l'adhésion des leucocytes et les globulins à l'endothélium des vaisseaux, en prévenant la formation et le développement des patches artérioscléreux, fait partie aux procès de la fibrinogénolyse, de la spermatogenèse. Le médicament fait l'effet anabolisant modéré, stimule l'activité du thymus, contribue à la synthèse de l'insuline et règle le taux de glucose dans le sang pendant la charge physique, contribue à la correction de l'équilibre acido-basique.
Pharmacocinétique. N'a pas été étudiée.

Caractéristiques pharmaceutiques.
Principales propriétés physico-chimiques: solution transparente, un peu jaunâtre à l'odeur caractéristique du caramel, un peu sucrée.

Validité.

2 ans.

Conservation.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Conserver à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25° C. Le délai d'utilisation après l'ouverture du flacon est 14 jours. Ne pas congeler!

Conditionnements. Flacons en plastique de 100 ml et de 200 ml. Boîtes en carton d'un flacon. Containers jetables de 5 ml, 10 ml, boîtes en carton de 10 containers.

Mode de délivrance.
Sans prescription médicale.

Producteur.

SARL « YURIA-PHARM ».

Siège.

SARL « YURIA-PHARM », r. M. Amosova, 10, Kiev, 03680, Ukraine

Date de la dernière modification.